



Catálogo de sementes híbridas

Perfis de referência para escolha e comercialização



Linha Hortasul Sementes

Abobrinhas Abóboras Brássicas Cucurbitáceas Bulbos Solanáceas Raízes

Linha de híbridos

Este catálogo apresenta o posicionamento comercial e os cuidados agrônômicos mais importantes de cada segmento. Como os nomes recebidos identificam grupos varietais, e não cultivares completos, ciclo, resistência, população e indicação regional devem ser confirmados na embalagem e na identificação oficial do lote.

Segmento	Padrão comercial	Ponto de atenção
Abobrinha Caserta	Fruto jovem, cilíndrico e verde-claro	Colheita frequente
Tetsukabuto	Casca escura e polpa firme	Uso de polinizador
Repolho	Cabeça compacta e uniforme	Adaptação à época
Pepino conserva	Fruto curto e firme	Tamanho exigido pela indústria
Cebola	Bulbos padronizados	Fotoperíodo e região
Tomate saladete	Fruto vermelho e alongado	Hábito de crescimento
Cenoura Brasília	Raiz cilíndrica e alaranjada	Uniformidade de emergência
Melancia Crimson	Casca listrada e polpa vermelha	Polinização e ploidia

Leitura rápida Os diferenciais atribuídos aos híbridos precisam ser associados ao cultivar exato. A mesma categoria pode reunir materiais com ciclos, hábitos de planta e pacotes de resistência distintos.

Abobrinha Caserta híbrida

Cucurbita pepo



Segmento de abobrinha italiana para colheita jovem, indicado ao mercado fresco. O padrão Caserta reúne frutos cilíndricos, verde-claros e com estrias longitudinais, valorizados quando apresentam casca tenra e formato uniforme.

Perfil do segmento Plantas normalmente compactas, frutos alongados e colheitas sucessivas. O uso de híbridos busca maior uniformidade de planta, formato e ponto comercial.

Atenção no cultivo Mantenha umidade regular e faça colheitas frequentes. Frutos que permanecem muito tempo na planta aumentam de tamanho, perdem maciez e podem reduzir a continuidade da produção.

Ciclo e colheita Segmento precoce. O início e a duração da colheita variam com o híbrido, a temperatura e o sistema de cultivo.

Mercado fresco Colheita jovem Uniformidade

Base técnica Embrapa O cultivo de hortaliças

Abóbora Tetsukabuto

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata



Híbrido interespecífico conhecido como abóbora japonesa ou cabotiá. Produz frutos de casca verde-escura, geralmente achatados, com polpa firme e amarelo-alaranjada, boa qualidade culinária e aptidão para armazenamento.

Perfil do segmento Plantas vigorosas e frutos de padrão comercial reconhecido. A polpa densa favorece o preparo doméstico, a gastronomia e o processamento.

Atenção no cultivo A maior parte dos híbridos Tetsukabuto não fornece pólen viável. A Embrapa recomenda distribuir plantas polinizadoras em 15% a 20% da área e sincronizar o florescimento. Preserve a atividade de abelhas durante a floração.

Ciclo e colheita Segmento de ciclo médio. Colha frutos maduros e faça a cura antes do armazenamento, conforme a recomendação técnica do híbrido.

Tipo cabotiá Polpa firme Exige polinizador

Base técnica Embrapa Hortaliças Recomendações técnicas para Tetsukabuto

Repolho híbrido

Brassica oleracea var capitata



Linha voltada à formação de cabeças uniformes e compactas. O formato pode ser redondo, levemente achatado ou alongado, conforme o híbrido e o mercado atendido.

Perfil do segmento Cabeças firmes, folhas sobrepostas e boa padronização de colheita são os principais atributos comerciais. Existem híbridos para diferentes épocas e faixas de temperatura.

Atenção no cultivo Escolha o material pela época e pela região. Maneje irrigação e nutrição com regularidade, acompanhe lagartas e doenças foliares e colha quando a cabeça estiver firme, antes de ocorrer rachadura.

Ciclo e colheita Há híbridos precoces, médios e tardios. A classificação e o número de dias devem ser confirmados na identificação do cultivar.

Cabeças compactas Padronização Mercado fresco

Base técnica Embrapa Cultivo e avaliação de híbridos de repolho

Pepino híbrido para conserva

Cucumis sativus

Segmento de frutos curtos e cilíndricos destinado à conserva e ao processamento. O valor comercial depende da uniformidade, da textura e da colheita no diâmetro solicitado pelo comprador.

Perfil do segmento Frutos verde-escuros, firmes e colhidos pequenos. Híbridos podem apresentar diferentes padrões de espinhos, relação comprimento e diâmetro e exigência de polinização.

Atenção no cultivo Faça colheitas muito frequentes e mantenha água disponível sem encharcamento. Defina o tamanho de colheita com a indústria. Confirme se o híbrido é polinizado por insetos ou partenocárpico antes de planejar o cultivo protegido.

Ciclo e colheita Segmento precoce e de colheita contínua. Temperatura, condução e frequência de retirada dos frutos alteram o rendimento comercial.

Conserva Fruto curto Colheita frequente

Base técnica Embrapa Hortaliças Pepino

Cebola híbrida

Allium cepa

Linha para produção de bulbos padronizados. Cor de película, formato, pungência, firmeza e capacidade de armazenamento dependem do híbrido e do segmento comercial escolhido.

Perfil do segmento O uso de híbridos favorece uniformidade de desenvolvimento e classificação. Materiais de película amarela atendem amplamente ao mercado fresco, mas há também segmentos brancos e roxos.

Atenção no cultivo Fotoperíodo e temperatura controlam a bulbificação. Use apenas híbridos adaptados à latitude e à época de plantio. Após a colheita, faça a cura e o armazenamento com boa ventilação.

Ciclo e colheita Variável conforme o fotoperíodo, a região, o sistema de implantação e o híbrido. A indicação regional é mais importante que uma faixa geral de dias.

Bulbos uniformes Escolha regional Cura pós-colheita

Base técnica Embrapa Agência de Informação Tecnológica da Cebola

Tomate híbrido tipo saladete

Solanum lycopersicum



Também chamado de tomate italiano, o grupo saladete apresenta frutos vermelhos e alongados, com polpa espessa e, em geral, duas ou três lojas internas. Atende ao consumo fresco, a molhos e ao preparo de tomate seco.

Perfil do segmento Formato alongado, boa proporção de polpa e versatilidade culinária. Há híbridos de crescimento determinado e indeterminado para campo aberto ou ambiente protegido.

Atenção no cultivo Defina tutoramento, poda e duração da colheita pelo hábito de crescimento. Resistências a vírus, fungos, bactérias e nematoides são específicas de cada híbrido e devem aparecer na descrição oficial do cultivar.

Ciclo e colheita Varia conforme o hábito de crescimento e o sistema de cultivo. Materiais determinados concentram mais a colheita; indeterminados mantêm produção por período mais longo.

Tipo italiano Polpa espessa Uso versátil

Base técnica Embrapa Hortaliças Produção Integrada de Tomate Tutorado

Cenoura híbrida tipo Brasília

Daucus carota



Segmento inspirado no grupo Brasília, desenvolvido para cultivo em condições quentes. O padrão comercial reúne raízes quase cilíndricas, alaranjadas e com baixa incidência de ombro verde ou roxo.

Perfil do segmento Como referência do grupo, a Embrapa descreve raízes de 15 a 22 cm de comprimento e 3 a 4 cm de diâmetro. Híbridos buscam maior uniformidade de formato e classificação.

Atenção no cultivo Faça semeadura direta e uniforme, preserve umidade na emergência e evite solo compactado. Adaptação ao verão e resistência à queima-das-folhas devem ser verificadas para o híbrido específico.

Ciclo e colheita A cultivar Brasília é colhida, em geral, entre 85 e 100 dias após a semeadura. Use essa faixa apenas como referência do grupo; o híbrido comercial pode diferir.

Tipo Brasília Verão Raízes uniformes

Base técnica Embrapa Agência de Informação Tecnológica da Cenoura

Melancia Crimson híbrida

Citrullus lanatus

Segmento com frutos redondos a elípticos, casca verde-clara com listras verde-escuras e polpa vermelha. O padrão visual do tipo Crimson tem ampla aceitação no mercado brasileiro.

Perfil do segmento Híbridos diploides normalmente produzem frutos com sementes. Híbridos triploides são comercializados como sem sementes e exigem manejo próprio de mudas e polinização.

Atenção no cultivo Favoreça a presença de abelhas e evite aplicações que prejudiquem polinizadores durante a floração. Quando o híbrido for triploide, plante também um polinizador diploide compatível e bem distribuído.

Ciclo e colheita Segmento geralmente precoce a intermediário. Tamanho de fruto, resistência a doenças e dias até a colheita variam de forma importante entre híbridos.

Tipo Crimson Polpa vermelha Atenção à polinização

Base técnica Embrapa Semiárido Sistema de Produção de Melancia

Informação técnica e fontes

As descrições indicam o perfil típico de cada segmento. Resultados no campo variam com cultivar, lote, clima, solo e manejo. Consulte sempre a embalagem, o responsável técnico e a recomendação regional antes do plantio.

Na comercialização, a denominação do cultivar e sua situação no Registro Nacional de Cultivares devem corresponder à identificação oficial do material. Resistências, tolerâncias e garantias de qualidade não devem ser transferidas de um híbrido para outro.

Referências consultadas

- [Abóbora Tetsukabuto](#)
- [Cenoura do grupo Brasília](#)
- [Cebola e exigências de clima](#)
- [Tomate do grupo Saladete](#)
- [Melancia e escolha de cultivares](#)
- [Melancia sem sementes e polinizadores](#)
- [Pepino](#)
- [Cultivo de hortaliças](#)
- [Registro Nacional de Cultivares](#)

Imagens Composições ilustrativas produzidas para este catálogo. A aparência do produto colhido pode variar conforme o cultivar e o manejo.

Hortasul Sementes